

Kindernotfallkoffer für den stationären Bereich (außer Neonatologie)

Stand 3.08

	Anzahl (mind.)	Besonderheiten
Kinder-Beatmungsbeutel (500 ml)	1	mit O ₂ -Reservoir
Erwachsenen-Beatmungsbeutel	1	mit O ₂ -Reservoir
Laryngoskop	1	
mit geradem Spatel Gr. 1	1	
mit gebogenem Spatel Gr. 2 , 3 , 4	je 1	
Endotrachealtuben :		
ohne Cuff I.D. 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	je 1	
mit Cuff I.D. 6 / 6,5 / 7	je 1	
Führungsdraht für Tubus 2,5 u. 5,0	je 1	
Beatmungsmasken für Sgl, KK, SK, Erw	je 1	
Larynxmasken Gr. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3	je 1	<i>optional</i>
Guedeltuben Gr. 0 , 1 , 2 , 3	je 1	
O ₂ -Masken Gr. klein / mittel / groß	je 1	
Magillzange klein / groß	je 1	
Absaugkatheter Ch. 8 , 10 , 12 , 14	je 1	
Magensonden Ch. 10 , 14	je 1	
Gefäßzugänge + Zubehör:		
Venenkanülen G 16 , 18 , 20 , 22	je 2	
Einmalnadeln G 18 , 20 , 22	je 2	
Entnahmekanülen	3	
Dreiwegehähne	3	
Verschlussstoppel	3	
Einmalspritzen Gr. 1 , 2 , 5 , 10 , 20 ml	3	
Infusionsbestecke	3	
Staubbinde	1	
Einmalhandschuhe 6,5 / 7,5 / 8,5	je 2	
Desinfektionsmittel	1	
Sterile Tupfer		
Schere	1	
Leucoplast	1	
PEHA-Haft	1	
Gleitmittel (Cathejell)	1	

Medikamente :		
Epinephrin 1 : 10000	3 Amp.	
Atropin	2 Amp.	
Amiodaron	1 Amp.	
Natriumbikarbonat	1 Amp.	
Antihistaminikum	1 Amp.	
Midazolam	2 Amp.	
Ketamin	2 Amp.	
Propofol	2 Amp.	<i>optional</i>
Thiopental	1 Amp.	<i>optional</i>
Diazepam Rect.	2 Rect.	<i>optional</i>
Flumazenil	1 Amp.	<i>optional</i>
Vecuronium od. Rocuronium	2 Amp.	<i>optional</i>
Suxamethonium	1 Amp.	<i>optional</i>
Naloxon	1 Amp.	<i>optional</i>
Methylprednisolon	2 Amp.	<i>optional</i>
Theophyllin	1	<i>optional</i>
β-Mimetikum-Spray	1	<i>optional</i>
Epinephrin-Spray	1	<i>optional</i>
Volumen :		
0,9 % NaCl	100 ml	
isotone Elyt-Lsg.	2 x 500 ml	
Glukose 10%	500 ml	
Defibrillator - Halbautomat	1	<i>optional</i>

Zusammenstellung durch die ARC-Arbeitsgruppe Innerklinische Reanimation,
für die Arbeitsgruppe: R.Kraschl und S.Ofner